



En sachant exactement à quoi vous attendre de la part des traitements par Synvisc[®], vous serez plus à l'aise et confiant(e) pendant et après l'injection. Veuillez lire attentivement les renseignements suivants pour vous aider à vous préparer à votre traitement, puis reportez-vous à cette fiche pour obtenir des conseils sur les soins dont vous pourriez avoir besoin à la suite du traitement.

Avant votre visite

Étant donné que Synvisc[®] n'est pas un médicament, il ne devrait pas interagir avec les autres médicaments que vous prenez déjà. Assurez-vous quand même d'en informer votre médecin, sans oublier de mentionner les médicaments en vente libre que vous utilisez.

Pendant la visite de l'injection

Pour préparer l'articulation de votre genou ou de votre hanche, votre médecin pourrait :

1. frictionner votre genou avec de l'alcool et de l'iode;
2. appliquer un anesthésique local;
3. retirer l'excès de liquide de votre articulation.

Le médecin injectera ensuite Synvisc[®] dans l'articulation de votre genou ou de votre hanche. Dans le cas de la hanche, il pourrait avoir recours à l'imagerie pour visionner l'intérieur de l'articulation pendant l'injection. La procédure complète ne devrait prendre que quelques minutes, et vous pourrez rentrer chez vous aussitôt après le traitement.

À quoi vous attendre

Certains patients commencent à ressentir les effets bénéfiques de Synvisc aussitôt après la première injection; dans le cas du genou, vous devrez recevoir les trois injections pour obtenir l'effet optimal. La plupart des patients ressentent le plus de soulagement de 8 à 12 semaines après la troisième injection.

Conseils à suivre après l'injection

Après avoir reçu le traitement par Synvisc®, suivez bien les directives de votre médecin. Veuillez utiliser cette liste comme référence pour savoir à quoi vous attendre.

Lorsque vous rentrez chez vous :

- Posez un bloc réfrigérant sur le point d'injection pendant deux à trois heures ou selon les recommandations de votre médecin.
- Évitez de trop solliciter votre genou ou votre hanche – par exemple en faisant du jogging, en soulevant des objets ou en restant debout trop longtemps – pendant les 48 heures suivant les injections.

Demandez à votre médecin à quel moment vous pouvez reprendre vos activités habituelles.

Effets secondaires possibles

Les effets secondaires sont généralement bénins et passagers. Ils peuvent comprendre :

- des douleurs au point d'injection;
- une enflure ou une rougeur;
- une accumulation de liquide.

Les effets secondaires moins fréquents comprennent :

- l'érythème,
- les démangeaisons,
- l'urticaire,
- l'infection.

Coordonnées du médecin

Si vous présentez ces effets secondaires ou toute autre réaction, assurez-vous de communiquer avec votre médecin. Veuillez inscrire ci-dessous son nom et son numéro de téléphone afin de les retrouver facilement en cas de besoin.

Nom du médecin : _____

Numéro de téléphone : _____